

## МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать прием/использование этого лекарства. Это лекарство отпускается без рецепта. Для достижения оптимальных результатов его следует использовать, строго выполняя все рекомендации изложенные в инструкции.

- Сохраните инструкцию, она может потребоваться вновь
- Если у вас возникли вопросы, обратитесь к врачу

### **ИНСТРУКЦИЯ по применению лекарственного препарата для медицинского применения ТАУФОН**

**Регистрационный номер:** ЛС-001210

**Торговое название:** Тауфон.

**Международное непатентованное название:** Таурин (Taurine).

**Химическое название:** 2-Аминоэтансульфоновая кислота.

**Лекарственная форма:** капли глазные.

**Состав:** 1мл раствора содержит:

Активное вещество:

таурин - 40 мг

Вспомогательные вещества:

метилпарагидроксибензоат (метилпарабен) - 1мг

1 М раствор натрия гидроксида до pH 5,0 - 6,5

вода для инъекций до 1 мл

**Описание:** прозрачная бесцветная жидкость.

**Фармакотерапевтическая группа:** метаболическое средство

**Код АТХ:** S01XA.

**Фармакологические свойства:** Таурин является серосодержащей аминокислотой, образующейся в организме в процессе превращения цистеина. Стимулирует процессы репарации и регенерации при заболеваниях дистрофического характера и заболеваниях, сопровождающихся резким нарушением метаболизма глазных тканей.

Способствует нормализации функций клеточных мембран, активизации энергетических и обменных процессов, сохранению электролитного состава цитоплазмы за счет накопления  $K^+$  и  $Ca^{2+}$ , улучшения условий проведения нервного импульса.

**Фармакокинетика:**

При местном применении системная абсорбция низкая.

**Показания к применению:**

Препарат назначают взрослым при:

- Дистрофиях роговицы;
- Старческих, травматических, лучевых и других видах катаракт;
- Травмах роговицы (в качестве стимулятора репаративных процессов);
- Первичной открытоугольной глаукоме в сочетании с  $\beta$ -адреноблокаторами (для улучшения оттока водянистой влаги).

При всех показаниях препарат применяется в составе комплексной терапии.

**Противопоказания:** Индивидуальная повышенная чувствительность к таурину, детский возраст до 18 лет.

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания:**

Достаточного опыта по применению препарата во время беременности, кормления грудью нет. Возможно применение Тауфона для лечения беременных и кормящих матерей по назначению лечащего врача, если ожидаемый лечебный эффект превышает риск развития возможных побочных эффектов.

**Способ применения и дозы:**

При катарактах Тауфон назначают в виде инстилляций по 1-2 капли 2-4 раза в день в течение трех месяцев. Курс повторяют с месячным интервалом.

При травмах и дистрофических заболеваниях роговицы применяют в тех же дозах в течение одного месяца.

При открытоугольной глаукоме (в сочетании с бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил метилоксиадиазолом и его комбинированными формами или тимололом) – по 1-2 капли 2 раз в день, за 15-20 минут до назначения одного из гипотензивных средств, в течение 6 недель с последующей отменой на 2 недели.

**Побочное действие:** аллергические реакции.

Если указанные в инструкции побочные эффекты усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, **сообщите об этом врачу.**

**Передозировка:** Данные о передозировке отсутствуют.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:** У больных глаукомой (открытоугольной) отмечено значительно усиление гипотензивного действия  $\beta$ -адреноблокаторов (тимолола и бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил метилоксиадиазола) в случае совместного применения с Тауфоном.

Усиление эффекта достигается за счет увеличения коэффициента легкости оттока и снижения продукции водянистой влаги.

**Форма выпуска:**

Капли глазные 4%.

1,5 мл, 2 мл или 5 мл в тубик-капельницы полимерные.

1, 2, 4, 5 или 10 тубик-капельниц с инструкцией по применению препарата в пачку из картона.

5 мл или 10 мл во флакон-капельницы полимерные.

1 или 2 флакон-капельницы с инструкцией по применению препарата в пачку из картона.

Текст инструкции по применению тубик-капельницы или флакон-капельницы нанесен на пачке.

5 мл во флаконы стеклянные.

1 флакон в комплекте с крышкой-капельницей в стерильном исполнении и инструкцией по применению препарата в пачку из картона.

5 флаконов в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной.

1 контурную ячейковую упаковку в комплекте с 5 крышками-капельницами в стерильном исполнении и инструкцией по применению препарата в пачку из картона.

**Условия хранения:**

В защищенном от света месте при температуре не выше 15° С (для препарата в тубик-капельницах).

В защищенном от света месте при температуре не выше 25° С (для препарата во флакон-капельницах и во флаконах).

Хранить в местах, недоступных для детей.

**Срок годности:**

2 года в тубик-капельницах.

3 года во флакон-капельницах.

4 года во флаконах.

Срок годности препарата после вскрытия - 1 месяц.

*Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.*

**Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

**Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение/организация, принимающая претензии:**

Федеральное государственное унитарное предприятие “Московский эндокринный завод”, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, 25. Тел./факс (495) 678-00-50 / 911-42-10.

**Производитель:** Федеральное государственное унитарное предприятие “Московский эндокринный завод”.